


TYR Anamix Infant

Modersmjölksersättning avsedd för kostbehandling av tyrosinemi med LCP och spädbarnets kostfiber GOS/FOS



TYR Anamix Infant

TYR Anamix Infant är en modersmjölksersättning utan fenylalanin och tyrosin, avsedd för kostbehandling av tyrosinemi hos spädbarn 0–1 år. Innehåller essentiella och icke essentiella aminosyror, kolhydrat, fett, vitaminer, mineraler och spårämnen. Den är kompletterad med LCP (långkedjiga fettsyror), arakidonsyra (ARA) och dokosahexaensyra (DHA) i nivåer som motsvarar bröstmjölkens. Dessutom innehåller TYR Anamix Infant en unik kostfiberblandning av GOS/FOS (galakto- och fruktooligosackarider).

TYR Anamix Infant måste kompletteras med naturligt protein, t.ex. från bröstmjolk, för att täcka behovet av fenylalanin och tyrosin enligt ordination från dietist eller läkare.

TYR Anamix Infant per 100 ml vid en spädning på 15 g/100 ml

- 70 kcal
- 3,5 g fett från solros-, soja-, kokos-, raps- och encellsolja med hög halt av ARA och DHA (44 E%)
- 7,5 g kolhydrat från glukossirap (43 E%)
- 0,56 g kostfiber från galakto- och fruktooligosackarider GOS/FOS (2 E%)
- 2 g proteinekvalenter (11 E%)

ANVÄNDNING

TYR Anamix Infant är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och används under inrådan av dietist eller läkare som modersmjölksersättning i kostbehandling av tyrosinemi hos spädbarn 0–1 år. Lämplig som komplement till barnets övriga kost från 1–3 år.

DOSERING

Doseringen är individuell och görs i samråd med dietist eller läkare.

TILLREDNING

Spädning: Det rekommenderas att använda skopan som finns med i burken för rätt dosering. För varje skopa (5 g) tillsätts 30 ml vatten för att uppnå rekommenderad koncentration (15%). Initialt kan en lägre koncentration krävas för att säkerställa fullgod acceptans. Modersmjölksersättning i pulverform är inte steril. TYR Anamix Infant skall därför tillredas strax innan matningstillfället och inte varmhållas längre än 15 minuter innan näringen serveras. Överbliven näring kastas.

1. För att undvika kontamination, tvätta händerna och använd alltid väl rengjorda hushållsredskap.
2. Koka upp vatten (använd aldrig varmt vatten direkt från kranen). När det gäller äldre barn behöver vattnet som regel inte kokas om vattenkvaliteten är god, men pulvret löser sig bäst i varmt vatten.
3. Låt vattnet svalna några minuter och mät upp avsedd mängd vatten i en nappflaska/behållare.
4. Tillsätt rekommenderat antal skopor pulver till vattnet.
5. Vispa eller skaka kraftigt tills pulvret löst sig.
6. Kontrollera blandningens temperatur genom att droppa TYR Anamix Infant på insidan av din handled.

FÖRVARING OCH HÅLLBARHET

Öppnad burk lagras torr, ej över normal rumstemperatur. Bäst-före datum anges på burkens botten som dag-månad-år. Öppnad burk försluts väl och förbrukas inom två veckor.

INGREDIENSER

Torkad glukossirap, raffinerat vegetabiliskt fett (solrosolja med hög andel oljesyra, soja-, icke hydrerad kokos-, raps- och solrosolja), kostfiberblandning (galakto-oligosackarider (GOS) (från mjölk), frukto-oligosackarider (FOS)), L-lysin- L-glutamat, L-leucin, laktos (från mjölk), glukos (från mjölk), L-prolin, L-arginin, L-valin, kalciumfosfat tribasisk, glycin, L-isoleucin, L-asparaginsyra, emulgeringsmedel (E472c), L-treonin, L-serin, L-alanin, L-histidin, kaliumklorid, trikaliumcitrat, L-cystin, dinatriumvätefosfat, L-tryptofan, magnesiumacetat, encellsolja med hög andel arakidonsyra, L-metionin, kolinbitartrat, encellsolja med hög andel dokosahexaensyra, L-glutamin, natriumklorid, M-Inositol, L-askorbinsyra, L-glutaminsyra, galaktos (från mjölk), taurin, järnsulfat, zinksulfat, L-karnitin, DL- α -tokoferylacetat, kalcium-D-pantotenat, nikotinamid, antioxidanter (E304, E306, E307), mangansulfat, kopparsulfat, tiaminhydroklorid, pyridoxinhydroklorid, riboflavin, vitamin A-acetat, kaliumjodid, kromklorid, folsyra, vitamin K₁, natriumselenit, natriummolybdat, D-biotin, vitamin D₃, cyanokobalamin.

Nutricias produkter är livsmedel för speciella medicinska ändamål och skall användas under inrådan av dietist eller läkare.

Nutricia. Tel: 08-24 15 30. www.nutricia.se

Näringsvärde		per 100 g	Per 100 ml 15% spädning
Energi		Kcal 466	70
		kJ 1950	293
Fett (44 E%)		g	23,0
varav			3,5
– mättat	g	7,5	1,1
– enkelomättat	g	9,4	1,4
– fleromättat	g	5,0	0,75
varav			
– linolsyra (LA)	g	4,1	0,62
– α -linolensyra (ALA)	g	0,66	0,1
– arakidonsyra (ARA)	mg	140	20
– dokosahexaensyra (DHA)	mg	70	10
Förhållandet n6:n3		5,9:1	
Kolhydrat (43 E%)		g	49,8
varav sockerarter	g	7,3	1,1
Kostfiber (2 E%)		g	3,7
– lösliga	g	3,7	0,56
– olösliga	g	–	–
Proteinekvalenter (11 E%)		g	13,1
Salt		g	0,5
Aminosyror		g	15,5
L-alanin	g	0,68	0,1
L-arginin	g	1,19	0,18
L-asparaginsyra	g	1,0	0,15
L-cystine	g	0,45	0,07
L-glutamin	g	0,11	0,02
L-glutaminsyra	g	1,34	0,2
Glycin	g	1,07	0,16
L-histidin	g	0,68	0,1
L-isoleucin	g	1,07	0,16
L-leucin	g	1,83	0,28
L-lysin	g	1,24	0,19
L-metionin	g	0,29	0,04
L-fenylalanin	g	ej tillsatt	ej tillsatt
L-prolin	g	1,3	0,2
L-serin	g	0,8	0,12
L-treonin	g	0,89	0,13
L-tryptofan	g	0,36	0,05
L-tyrosin	g	ej tillsatt	ej tillsatt
L-valin	g	1,17	0,18
Mineraler			
Natrium	mg (mmol)	191 (8,3)	28,7 (1,2)
Kalium	mg (mmol)	501 (12,8)	75,2 (1,9)
Klorid	mg (mmol)	355 (10,1)	53,3 (1,5)
Kalcium	mg (mmol)	410 (10,2)	61,5 (1,5)
Fosfor	mg (PO ₄ mmol)	300 (9,7)	45 (1,5)
Magnesium	mg (mmol)	58 (2,4)	8,7 (0,36)
Järn	mg	8,1	1,2
Zink	mg	5,7	0,86
Koppar	mg	0,43	0,06
Mangan	mg	0,43	0,06
Molybden	μ g	12	1,8
Selen	μ g	15,5	2,3
Krom	μ g	13,8	2,1
Jod	μ g	83	12,5
Vitaminer			
Vitamin A	μ g-RE	392	58,8
Vitamin D ₃	μ g	8,7	1,3
Vitamin E	mg α -TE	4,6	0,69
Vitamin C	mg	49	7,4
Vitamin K ₁	μ g	37,2	5,6
Tiamin	mg	0,5	0,08
Riboflavin	mg	0,5	0,08
Niacin	mg-NE	9,2	1,2
Pantotensyra	mg	2,8	0,42
Vitamin B ₆	mg	0,5	0,08
Folsyra	μ g	55	8,3
Vitamin B ₁₂	μ g	1,2	0,18
Biotin	μ g	18,2	2,7
Övriga näringsämnen			
Karnitin	mg	10	1,5
Kolin	mg	91	13,7
Inositol	mg	98	14,7
Taurin	mg	30	4,5
Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O		380

TYR Anamix Infant kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt från vår webshop: www.nutricia.se/order, e-post: order@nutricia.se telefon: 08-24 15 30 eller fax 019-76 62 330.

TYR Anamix Infant	Bestnr: 77 78 62	Förpackning: 1 burk à 400 g
-------------------	------------------	-----------------------------

En burk ger 2,6 l lösning vid en 15% spädning