

# Salovum®



salovum

Äggulepulver med hög halt av antisekretoriska proteiner  
Munankeltuissauhe, jossa on korkea antisekretoristen proteiinin pitoisuus.  
Äggblommepulver med høy innhold av antisekretoriske proteiner  
Eggplommepulver med høy innhold av antisekretoriske proteiner 25 x 4 gram

## Ett livsmedel för speciellt medicinska ändamål

Salovum® är en produkt baserad på Äggulepulver B221® och är en exogen tillförsel av höga halter av det i kroppen naturligt förekommande proteinet Antisekretorisk Faktor. Salovum® används bl a i akutskenen eller vid initial behandling av patienter med förmodat låga AF-nivåer.

### Antisekretorisk faktor (AF).

AF reglerar vatten- och jonbalansen över cellmembranen. AF kan normalisera vatten- och saltsekretionen i tarmen och är ett potent medel **mot diarré** <sup>1,2</sup>. AF kan också reglera trycket av den endolymfatiska vätskan i balansorganet och kan därför användas för behandling av **Menières sjukdom** <sup>3,4</sup>. AF kan tillföras kroppen i form av produkterna **SPC-Flakes®** och **Salovum®**. Båda produkterna är fria från tillsatser.

#### Användning vid behandling av:

För kostbehandling av besvär från ökade tarmflöden.

Menière <sup>3,4</sup>, IBD (Mb Crohn, Ulcerös Kolit), Diaréé sjukdomar, Mastitis <sup>5</sup>

#### Hur intas Salovum:

Salovum® rörs ut i kall vätska/juice. Bäst resultat uppnås med juice – gärna juice med fruktkött. Salovum® kan också strös under pålägg på bröd eller röras ner i blandning till äggrätter.

#### Dosering:

1- 2 påsar a 4gram 3 gånger dagligen eller enligt ordination.

#### Supportchat:

Du kan kontakta oss på [AF@poaab.com](mailto:AF@poaab.com) om du har frågor om hur man använder SPC-Flakes®. Vi svarar inom 24 timmar.

#### Referenser:

Eriksson, Shafazand, Jennische and Lange, Effect of Antisecretory Factor in Ulcerative Colitis on Histological and Laborative Outcome: A short Period Clinical Trial, Scand J Gastroenterol, 2003; 10:1045-1049.

Björck, Bosaeus, Ek, Jennische, Lönnroth, Johansson and Lange, Food induced stimulation of the antisecretory factor can improve symptoms in human inflammatory bowel disease: A study of a concept, Gut, 2000; 46:824-829. Hanner, Jennische and Lange,

Antisecretory Factor: A clinical innovation in Ménière's disease?, Acta Otolaryngol, 2003; 123:779-780. Zaman, Mannan, Lange, Lönnroth and Hanson,

B221, a medical food containing antisecretory factor reduces child diarrhoea: a placebo controlled trial, Acta Paediatrica Scandinavia 96:1655-1659, 2007.

#### Viktigt:

Viktigt: Salovum® ska användas i samråd med läkare eller dietist.

Rekommenderas till barn över ett år och vuxna. Salovum® är ett komplement till övrig kost.

Observera: Äggallergikerbör undvika Salovum®.

Salovum® används för akut behandling och effekten kommer omgående.

#### Förvaring:

Rumstemperatur

#### Förpackning:

25 x 4 g

vnr. 210681

| Näringsdeklaration | per 100 g |
|--------------------|-----------|
| Protein            | 33 g      |
| Carbohydrates      | 0g        |
| of which sugars    | 0g        |
| Total Fat          | 59 g      |
| of which saturates | 20 g      |
| Dietary fibers     | 2g        |
| Sodium             | 140 mg    |
| Chloride           | 1160 mg   |
| Potassium          | 190 mg    |
| Calcium            | 280 mg    |
| Phosphorous        | 960 mg    |
| Magnesium          | 23 mg     |
| Iron               | 9.9 mg    |
| Zink               | 7.1 mg    |
| Iodine             | 110 µg    |

| Näringsdeklaration | per 100 g |
|--------------------|-----------|
| Selenium           | 96 µg     |
| Manganese          | 0.28 mg   |
| Chromium           | 6 µg      |
| Molybdenum         | 14 µg     |
| Fluorine           | 200 mg    |
| Vitamin A          | 3400 µg   |
| Vitamin D          | 7 µg      |
| Thiamin            | 0.43 mg   |
| Vitamin B          | 0.11 mg   |
| Niacin             | 0.1 mg    |
| Folic Acid         | 330 µg    |
| Vitamin B          | 10 µg     |
| Pantotenic Acid    | 9 mg      |
| Biotin             | 148 µg    |
| Vitamin E          | 32 mg     |